



GUÍA PARA PACIENTES Y FAMILIAS

Mi estudio genético encontró una variante asociada al síndrome de Lynch

Genes **MLH1**, **MSH2**, **MSH6**, **PMS2** y **EPCAM**

¿Qué significa y qué puedo hacer?

Tu estudio encontró una variante patogénica (un cambio que altera el funcionamiento del gen) en uno de los genes del síndrome de Lynch: **MLH1**, **MSH2**, **MSH6**, **PMS2** o **EPCAM**. El síndrome de Lynch es una condición hereditaria que aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer, principalmente de colon y de endometrio (útero). Los riesgos y las recomendaciones cambian según el gen, por lo que te recomendamos revisar en tu informe cuál es el tuyo. Saberlo es una gran ventaja: las colonoscopías periódicas permiten prevenir el cáncer de colon, y existen medidas eficaces para reducir los demás riesgos.



Lo que SÍ significa

- Tienes un riesgo más alto que el promedio de algunos tipos de cáncer, principalmente de colon y de útero.
- Las colonoscopías periódicas previenen el cáncer de colon al extirpar los pólipos antes de que se transformen.
- Tus familiares cercanos pueden estudiarse para saber si tienen la misma variante.



Lo que NO significa

- No significa que tengas cáncer ni que vayas a tenerlo con seguridad.
- No es culpa de nadie: la variante se hereda o aparece por azar.
- No significa que debas tomar decisiones de inmediato: hay tiempo para informarte.



¿Qué es el síndrome de Lynch?

Los genes del síndrome de Lynch forman parte del sistema de "reparación de errores de emparejamiento" del ADN: funcionan como un corrector ortográfico que revisa y corrige los errores que se producen cada vez que una célula copia su ADN. Todas las personas tenemos dos copias de cada gen. Cuando una copia no funciona, los errores se acumulan con más facilidad y aumenta el riesgo de algunos cánceres.

Es la causa hereditaria más frecuente de cáncer colorrectal: afecta a cerca de 1 de cada 300 personas. Las variantes en **MLH1** y **MSH2** (o deleciones en **EPCAM** que apagan a **MSH2**) se asocian a los riesgos más altos y más tempranos; las variantes en **MSH6** y, sobre todo, en **PMS2**, a riesgos menores y más tardíos.



¿Cuánto aumenta el riesgo?

Riesgo aproximado de tener cáncer a lo largo de la vida:

Tipo de cáncer	Población general	MLH1	MSH2 / EPCAM	MSH6	PMS2
Colon y recto	4%	46–61%	33–52%	10–44%	9–20%
Endometrio (útero)	3,1%	34–54%	21–57%	16–49%	13–26%
Ovario	1,1%	4–20%	8–38%	hasta 13%	no aumentado
Vías urinarias	~2%	0,2–7%	2–28%	1–8%	—
Estómago	0,8%	5–7%	0,2–9%	hasta 8%	no aumentado



Tipo de cáncer	Población general	MLH1	MSH2 / EPCAM	MSH6	PMS2
Intestino delgado	0,3%	0,4–11%	1–10%	hasta 4%	—
Próstata	12,8%	datos insuficientes	hasta 24%	hasta 10%	—
Cerebro	0,6%	0,7–1,7%	2,5–7,7%	0,8–1,8%	—


Cifras de las guías NCCN (versión 1.2026), hasta los 80 años. —: no se ha demostrado un riesgo mayor que el de la población general. En **MLH1** y **MSH2** el cáncer de colon aparece en promedio cerca de los 44 años; en **PMS2**, después de los 60. Las deleciones en **EPCAM** que no incluyen a **MSH2** tienen un riesgo de colon similar, pero un riesgo de endometrio menor. No hay evidencia suficiente de un mayor riesgo de cáncer de mama.

Recuerda: muchas personas con síndrome de Lynch nunca desarrollan cáncer. Las colonoscopías periódicas permiten prevenir el cáncer de colon, y los demás controles ayudan a detectar otros cánceres a tiempo.



¿Cómo se hereda?

El síndrome de Lynch se hereda de forma autosómica dominante: basta una copia alterada para tener el riesgo aumentado. La variante puede venir de la madre o del padre, y afecta por igual a hombres y mujeres. Cada hijo o hija de una persona con la variante tiene un 50% de probabilidad de heredarla.



En cada embarazo: 50% de probabilidad de heredar la variante

Si ambos padres tienen una variante en el mismo gen de Lynch, cada hijo tiene un 25% de probabilidad de heredar las dos. Esto causa una enfermedad muy poco frecuente llamada deficiencia constitucional de reparación de errores (CMMRD), con riesgo de cánceres desde la infancia. Si planificas un embarazo, puedes conversar sobre la posibilidad de estudiar a tu pareja.



Mi plan de cuidado

Estas son las recomendaciones de las guías internacionales (NCCN 2026 y 2027), según el gen. Tu equipo de salud las adaptará a tu edad, tu historia familiar y tus preferencias.

Qué hacer	Desde cuándo	Con qué frecuencia
Colon y recto		
Colonoscopia de alta calidad	MLH1, MSH2: 20–25 años† · MSH6, PMS2: 30–35 años	MLH1, MSH2: cada 1–2 años · MSH6, PMS2: cada 1–3 años
Conversar sobre aspirina en dosis baja (100 mg al día) para reducir el riesgo de cáncer de colon y de otros cánceres de Lynch	Edad adulta (conversar)	Diaria, por varios años
Mujeres: útero y ovarios		



Qué hacer	Desde cuándo	Con qué frecuencia
Consultar ante cualquier sangrado uterino anormal o después de la menopausia (se evalúa con biopsia de endometrio)	Siempre	Siempre
Considerar biopsia de endometrio de control	30–35 años	Cada 1–2 años
Conversar sobre métodos que reducen el riesgo de cáncer de endometrio (por ejemplo, DIU con progestágeno)	Conversar	Según indicación
Conversar sobre histerectomía con extirpación de ovarios y trompas, una vez cumplido el deseo de tener hijos	MLH1, MSH2: 40 años · MSH6: 40 años (ovarios 45–50) · PMS2: 50 años o menopausia	Una vez
Hombres		
Conversar sobre antígeno prostático (APE)	MSH2, MSH6: 40 años	Anual, si se decide realizar
Otros órganos (MLH1, MSH2 y MSH6)		
Endoscopia digestiva alta, idealmente junto con la colonoscopia	30–40 años*	Cada 2–4 años
Estudio y tratamiento de Helicobacter pylori (bacteria del estómago)	Al diagnóstico	Una vez y según indicación
Considerar examen de orina anual (sobre todo si hay familiares con cáncer de las vías urinarias)	30–35 años	Anual
Estudio de páncreas (colangiografía o endosonografía), solo si hay un familiar de primer o segundo grado con cáncer de páncreas	50 años**	Anual
Examen de la piel por un profesional con experiencia en Lynch (lesiones sebáceas)	Según indicación	Cada 1–2 años
Vida saludable: no fumar, moderar el alcohol, mantener un peso adecuado, hacer actividad física y protegerse del sol	Siempre	Todos los días

† O 2 a 5 años antes del caso de cáncer de colon más joven en la familia, si fue antes de los 25 años. Aspirina: en CaPP3 (2026), 100 mg/día mostró eficacia similar a 600 mg/día con menos sangrado (no inferioridad no demostrada en todos los análisis). * O antes, según la historia familiar de cáncer de estómago o intestino delgado. ** O 10 años antes del caso de cáncer de páncreas más joven en la familia. Fuera del colon y el endometrio, las recomendaciones se basan en la opinión de expertos. En PMS2, los controles de otros órganos se deciden según la historia personal y familiar.

Sobre el cáncer de ovario: no existe un examen que permita detectarlo a tiempo de forma confiable (la ecografía y el marcador CA-125 no se recomiendan como control). Consulta si tienes síntomas persistentes como hinchazón abdominal, dolor pélvico o sensación de llenura precoz.

Si tienes o tuviste cáncer

Tu resultado también es importante para tu tratamiento. Puede influir en el tipo de cirugía (por ejemplo, en la extensión de una cirugía de colon) y, en algunos casos, en la elección de tratamientos: los tumores asociados al síndrome de Lynch suelen responder bien a la inmunoterapia. No está indicada en todos los casos: el comité oncológico evaluará qué corresponde en tu situación.



¿Qué significa para mi familia?



Comparte tu resultado con tus familiares de primer grado (padres, hermanos e hijos). Una copia del informe del laboratorio les facilitará el estudio.



Ellos pueden estudiarse solo para la variante que se encontró en ti. Es un examen más simple y económico que el tuyo.



Hombres y mujeres deben considerar el estudio: ambos tienen riesgo de cáncer de colon y otros cánceres, y pueden transmitir la variante.



Hijos e hijas se estudian habitualmente a partir de los 18 años, antes de la edad en que comienzan las colonoscopías. Si en la familia hay casos de cáncer muy jóvenes, el momento se conversa con el equipo.



Planificación familiar existen opciones como el diagnóstico genético preimplantacional. Consúltalas en asesoramiento genético.



Si un familiar no tiene la variante, su riesgo vuelve a ser similar al de la población general (salvo que tenga otros antecedentes).



Preguntas frecuentes



¿Voy a tener cáncer?

No necesariamente. Tu riesgo es mayor que el de la población general, pero muchas personas con síndrome de Lynch nunca desarrollan cáncer. Las colonoscopías permiten prevenir el cáncer de colon, y los demás controles ayudan a detectar otros cánceres a tiempo.



¿Por qué las recomendaciones dependen del gen?

Porque los riesgos son distintos: **MLH1** y **MSH2** se asocian a riesgos más altos y a edades más jóvenes, mientras que **MSH6** y **PMS2** tienen riesgos menores y más tardíos. Por eso las colonoscopías y las cirugías ginecológicas se recomiendan a edades diferentes. Revisa en tu informe cuál es tu gen.



¿Debo tomar aspirina?

Dos estudios internacionales (CAPP2 y CaPP3) mostraron que la aspirina diaria reduce el riesgo de cáncer en personas con síndrome de Lynch; el más reciente (2026) mostró que 100 mg al día tendría un efecto similar a dosis más altas, con menos sangrados. El beneficio aparece después de varios años. No es para todos (por ejemplo, con úlcera, problemas de coagulación, alergia o embarazo): conversa con tu médico antes de iniciarla.



¿Tengo que operarme del útero y los ovarios?

No es obligatorio. Es una opción que reduce el riesgo de cáncer de útero y de ovario, y se conversa una vez cumplido el deseo de tener hijos. La decisión es personal y depende de tu edad, tu gen, tu historia familiar y tus preferencias. Mientras tanto, es muy importante consultar ante cualquier sangrado anormal.



¿Es normal sentirme angustiado o preocupado?

Sí, es muy común. Hablarlo con tu familia, con tu equipo de salud o con un psicólogo puede ayudar. En Chile existen fundaciones y organizaciones que acompañan a pacientes y familias. Tu equipo puede orientarte sobre cuáles corresponden a tu situación.



Recuerda: conocer tu resultado te permite adelantarte. Con información, controles y acompañamiento, puedes cuidar tu salud y la de tu familia.

www.tugenetista.cl · contacto@tugenetista.cl

Referencias

National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial High-Risk Assessment: Colorectal, Endometrial, Esophageal, and Gastric. Versión 1.2026.

Dominguez-Valentin M, Sampson JR, Seppälä TT, et al. Cancer risks by gene, age, and gender in 6350 carriers of pathogenic mismatch repair variants: findings from the Prospective Lynch Syndrome Database. *Genet Med*. 2020;22(1):15-25.

Burn J, Borthwick GM, Elliott F, et al. Aspirin for cancer prevention in individuals with Lynch syndrome: first results from the CaPP3 multicentre, randomised, double-blind, non-inferiority trial. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2026;11:760-774.

Burn J, Sheth H, Elliott F, et al. Cancer prevention with aspirin in hereditary colorectal cancer (Lynch syndrome), 10-year follow-up and registry-based 20-year data in the CAPP2 study: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. *Lancet*. 2020;395(10240):1855-1863.

National Cancer Institute. SEER Cancer Stat Facts. <https://seer.cancer.gov/statfacts/>

Esta guía entrega información general y no reemplaza la consulta con tu médico o genetista.